

3.1 Logarithmen

Inhaltsverzeichnis

1	„Monate werden zu Tagen “	2
2	Der Logarithmus	3
3	Der Basiswechsel	4
4	Die Logarithmenregeln	5
5	Exponentialgleichungen	7
5.1	einfache Exponentialgleichungen	7
5.2	Exponentialgleichungen, die sich mit Zusammenfassen lösen lassen	8
5.3	Exponentialgleichungen, die sich mit Substitution lösen lassen	8
5.4	Exponentialgleichungen aus der Finanzmathematik	9
6	Logarithmusgleichungen	9
7	Anwendungen von Logarithmen	10
7.1	Die Lautstärke	10
7.2	Die Berechnung der Anzahl Ziffern einer Zahl mit dem Zehner-Logarithmus	11
8	Die Logarithmusfunktion	11
9	Zusatzaufgaben	12

1 „Monate werden zu Tagen“

Betrachten wir folgende Tabelle:

2^{-3}	2^{-2}	2^{-1}	2^0	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7	2^8	2^9	2^{10}	2^{11}	2^{12}
0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4096

Übung

- Berechne folgende Produkte ohne Taschenrechner, nur mit Hilfe der Tabelle.
 - $16 \cdot 256 =$
 - $0.25 \cdot 512 =$
 - $0.125 \cdot 4096 =$
- Berechne das Produkt $16 \cdot 256$ mit Hilfe der schriftlichen Multiplikation. Vergleiche die Anzahl der Berechnungsschritte mit denjenigen der Aufgabe 1(a).

Diese Idee, eine Zahl einfach als Potenz zu einer bestimmten Basis zu schreiben und dann die Potenzregeln anzuwenden, brachte die Mathematik enorm voran. Die umfangreichen Berechnungen, die vor allem in der Astronomie (z.B. Keplersche Gesetze) notwendig waren, konnten stark vereinfacht und damit beschleunigt werden. Eine Aussage von Laplace (ein bedeutender Mathematiker um 1750), der mehr als 150 Jahre (!) später lebte, verdeutlicht den hohen Wert dieser Idee:

„Diese Erfindung verringert den Arbeitsaufwand von Monaten auf Tage.“

Die obige Tabelle taugt natürlich nur dazu, das Prinzip zu verdeutlichen. Sie ist sehr lückenhaft, Berechnungen wie z.B. $327 \cdot 456$ können nicht durchgeführt werden.

Übung

- Drücke die Zahl 5 als 2^{\dots} aus, mit Hilfe der Hoch-Taste des TR. Berechne dabei 3 Stellen nach dem Komma (,...).

Die letzte Übung hat uns gezeigt, wie mühsam einer solcher Exponent zu berechnen ist, wenn es „nicht schön aufgeht“. Bestimmte Mathematiker, die natürlich keinen TR hatten (für die war es also noch viel mühsamer), verbrachten fast ihr ganzes Leben damit, solche Tabellen möglichst lückenlos aufzustellen. Einer davon war Jost Bürgi aus der Schweiz:



Bürgi wartete allerdings bis ca. 1620 mit der Veröffentlichung seiner Tafel. Naper, ein anderer Mathematiker, veröffentlichte seine Tafel, die er unabhängig von Bürgi erstellt hatte, bereits um 1614.

2 Der Logarithmus

Als erstes wollen wir kurz den Bezug zum ersten Abschnitt herstellen. Bei der Übung 2 haben wir die Frage gestellt: $2^x = 5$. Dieser Zahl x sagen wir $\log_2 5$ (gesprochen: Der Logarithmus von 5 zur Basis 2). Wir definieren:

Definition 1

Am Anfang ist es schwierig, einen Logarithmus direkt aus der Definition zu berechnen. Wir werden deshalb ein Rezept kennenlernen.

Gehen wir als Hilfe schnell zum Wurzelbegriff zurück:

Nun zum Logarithmus:

Frage: Wieviel ist $\log_2 8$?

Antwort:

Wir müssen uns einfach überlegen: 2 hoch wieviel gibt 8 ? Das wir uns genau das überlegen müssen, ist wiederum Abmachungssache. Wir können hier also nicht herausfinden, was wir uns überlegen müssen !

Beispiele:

- $\log_3 9 =$
- $\log_4 64 =$

Übungen

4. Berechne die Werte der folgenden Logarithmen.

- | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| a) $\log_3 81 =$ | b) $\log_5 25 =$ | c) $\log_2 16 =$ |
| d) $\log_{12} 144 =$ | e) $\log_5 1 =$ | f) $\log_{10} \frac{1}{10} =$ |
| g) $\log_{0.5} 8 =$ | h) $\log_{10} 0.01 =$ | i) $\log_2 8^{12} =$ |

[4, 2, 4, 2, 0, -1, -3, -2, 36]

5. lg ist die Abkürzung für \log_{10} . Berechne die Werte der folgenden Logarithmen.

- | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|
| a) $\lg 10^7 =$ | b) $\lg 10000 =$ | c) $\lg 0.0001 =$ |
|-----------------|------------------|-------------------|

[7, 4, -4]

6. Berechne die Werte der folgenden Logarithmen ($a \in \mathbf{R}^+, n \in \mathbf{N}$).

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| a) $\log_a 1 =$ | b) $\log_a a =$ | c) $\log_a a^2 =$ |
| d) $\log_a a^n =$ | e) $\log_a \frac{1}{a} =$ | f) $\log_a \frac{1}{a^2} =$ |
| g) $\log_a \frac{1}{a^n} =$ | h) $\log_a \sqrt{a} =$ | i) $\log_a \sqrt[3]{a} =$ |

[0, 1, 2, n, -1, -2, -n, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$]

7. ln (natürlicher Logarithmus) ist die Abkürzung für \log_e , wobei $e = 2.71\dots$ die Eulersche Zahl ist. Berechne die folgenden natürlichen Logarithmen.

- | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|
| a) $\ln e^2 =$ | b) $\ln \frac{1}{e} =$ | c) $\ln \sqrt{e} =$ |
| d) $\ln e =$ | e) $\ln(\ln(e)) =$ | f) $e^{2\ln(e)} =$ |
| g) $\ln 0 =$ | | |

[2, -1, $\frac{1}{2}$, 1, 0, e^2 , k.W.]

8. Schreibe einen Logarithmus auf, der den folgenden Wert ergibt:

4 Die Logarithmenregeln

Zuerst eine einführende Übung:

Übung

17. Fülle die Lücken aus mit Zahlen oder $+$ $-$ $|\cdot|$ $:-$ Zeichen. Überprüfe nachher Deine Lösung mit Nachrechnen.

a) $\log_2(16 \cdot 8) = \log_2(\dots) \dots \log_2(\dots)$

b) $\log_2(16 : 8) = \log_2(\dots) \dots \log_2(\dots)$

c) $\log_2 4^4 = \dots \dots \log_2(\dots)$

Es gelten die folgenden Logarithmenregeln:

Satz 2 *Es gelten die folgenden Gleichungen:*

- $\log_a(b \cdot c) = \dots \dots \dots$

- $\log_a(b : c) = \dots \dots \dots$

- $\log_a b^q = \dots \dots \dots$

Beweise

Übungen

18. Schreibe als ganze Zahl.

a) $\log_3(27 \cdot 9) =$

b) $\log_2(8 \cdot 16) =$

c) $\log_2(16^5) =$

d) $\log_4(2) + \log_4(8) =$

e) $\log_3(54) - \log_3(2) =$

f) $\log_2(48) - \log_2(3) =$

[5, 7, 20, 2, 3, 4]

19. Wende die Logarithmengesetze (von links nach rechts) möglichst oft an.

a) $\log_a(bc) =$

b) $\log_a(b(c+d)) =$

c) $\log_a(pq + pr) =$

d) $\log_a(4x^2 - 9y^2) =$

e) $\log_a \frac{b}{c} =$

f) $\log_a \frac{b}{c+d} =$

g) $\log_a \frac{1-x^2}{x^2-y^2} =$

h) $\log_a b^3 =$

i) $\log_a(b+c)^4 =$

j) $\log_a \frac{1}{c^2} =$

k) $\log_a \sqrt{s} =$

[$\log_a b + \log_a c, \log_a b + \log_a(c+d), \log_a p + \log_a(q+r), \log_a(2x+3y) + \log_a(2x-3y), \log_a b - \log_a c, \log_a b - \log_a(c+d)$]

[$\log_a(1+x) + \log_a(1-x) - \log_a(x+y) - \log_a(x-y), 3\log_a b, 4\log_a(b+c), -2\log_a c, \frac{1}{2}\log_a s$]

20. Forme so um, dass im Ergebnis nur ein log-Zeichen vorkommt und dass vor dem log-Zeichen keine Zahl steht !

a) $\log_a m + \log_a n =$

b) $3\log_a m =$

c) $\frac{1}{2}\log_a m =$

d) $\log_a b + \log_a c - \log_a d - \log_a c =$

e) $3\log_a b + 2\log_a c - 4\log_a d =$

f) $2\log_a x + 3\log_a y - 5(\log_a u + \log_a v) =$

[$\log_a(mn), \log_a m^3, \log_a \sqrt{m}, \log_a \left(\frac{b}{d}\right), \log_a \left(\frac{b^3 c^2}{d^4}\right), \log_a \left(\frac{x^2 y^3}{u^5 v^5}\right)$]

21. Gib x als Dezimalzahl an. Runde Dein Ergebnis auf zwei Stellen nach dem Komma.

a) $x = \lg(2.46 \cdot 10^{7890})$

[7890.39]

b) $x = \lg(9.87 \cdot 10^{-6543})$

[-6542.01]

c) $x = \ln(7.23 \cdot 10^{5073})$

[11682.99]

d) $x = \log_2(2.84 \cdot 10^{-4657})$

[-15468.71]

5 Exponentialgleichungen**5.1 einfache Exponentialgleichungen****Beispiel:** $5^x = 14$

Übungen

22. Löse die folgenden Exponentialgleichungen. Runde Dein Ergebnis auf zwei Kommastellen. Kontrolliere Dein Ergebnis durch Einsetzen.

a) $2^x = 11$

b) $3^x = 0.052$

c) $0.8^x = 0.005$

d) $e^{-x} = 100$

e) $10^{\frac{1}{x}} = 0.1997$

f) $7^{\sqrt{x}} = 3$

[3.46,-2.69,23.74,-4.61,-1.43,0.32]

5.2 Exponentialgleichungen, die sich mit Zusammenfassen lösen lassen**Beispiel:** $3^{2x} + 3^{2x+2} = 100$ **Übungen**

23. Löse die folgenden Exponentialgleichungen. Runde Dein Ergebnis auf zwei Kommastellen. Kontrolliere Dein Ergebnis durch Einsetzen.

a) $2^{4x} + 2^{4x+5} = 99$

b) $5^{3x+1} - 5^{3x-1} = 48$

c) $5^{x-1} + 6^x = 6^{x+1} - 5^x$

[0.396;0.48;-7.83]

5.3 Exponentialgleichungen, die sich mit Substitution lösen lassen**Beispiel:** $9^x - 2 \cdot 3^x - 8 = 0$

Übungen

24. Löse die folgenden Exponentialgleichungen. Runde Dein Ergebnis auf zwei Kommastellen. Kontrolliere Dein Ergebnis durch Einsetzen.

a) $10^x + 10^{2x} = 600$

b) $2^x + 3 = 4^x$

c) $e^x = 1 + e^{-x}$

[1.38;1.20;0.48]

5.4 Exponentialgleichungen aus der Finanzmathematik**Beispiel**

$$K_0 = R \frac{q^n - 1}{q^n(q - 1)}$$

Übungen

25. Löse die folgenden Gleichungen nach n auf.

a) $a_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$

b) $K_0 = Rq \frac{q^n - 1}{q^n(q - 1)}$

6 Logarithmusgleichungen

Beispiel: $\log_a(x-3) - \log_a 6 = \log_a 7 - \log_a(x-4)$

Übungen

26. Löse die folgenden Gleichungen ($a \in \mathbf{R}^+$).

a) $3 \log_a x = 2 \log_a 8$

b) $\log_a(x+4) + \log_a(x) = \log_a(x+1)$

c) $\log_a x^2 - \log_a 8 = \log_a 8 - \log_a 27$

d) $\frac{1}{2} \log_a(x+1) = \log_a 10 - \log_a 2$

e) $\log_2(x+9) = 4 + \log_2(x-6)$

[4|0.30|±1.54|24|7]

7 Anwendungen von Logarithmen

7.1 Die Lautstärke

Die Lautstärke wird in W/m^2 gemessen. Die Messwerte, die dabei herauskommen, sind meist sehr kleine Zahlen. Mit Hilfe des Logarithmus rechnen wir diese Zahlen so um, dass wir besser handhabbare Zahlen erhalten. Die Umrechnungsformel sieht so aus:

$$L = 10 \log \left(\frac{J}{J_0} \right)$$

wobei:

- L : Lautstärke in dB (Dezibel)
- J : Schallintensität der Quelle (z.B. Sänger, Auto, ...)
- J_0 : Schallintensität der Hörschwelle (das ist die Lautstärke, die gerade nicht mehr gehört wird)

9 Zusatzaufgaben

35. Wie heisst die Endziffer (=Einerziffer) von 5^{150} ; welche Ziffer steht am Anfang ? (Hinweis: Betrachte den Zehnerlogarithmus dieser Zahl).
36. Wieviele Endnullen hat die Zahl 50^{150} ? Mit welcher Ziffer beginnt sie ?
37. Welches ist die erste und die letzte Ziffer von 2^{1000} ?
38. Welches ist die erste und die letzte Ziffer von $(4^4)^4$, $(7^7)^7$ und $(3^4)^5$?

10 Anhang

Artikel aus SPIEGELOnline zur grössten bisher gefundenen Primzahl.

(<http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,443817,00.html>)

9.808.358 Ziffern, Punkt nicht mitgezählt: Das ist die neueste grösste Primzahl. Zwei US-amerikanische Mathematiker haben „M32582657“ entdeckt - mit Hilfe von 700 Computern, die neun Monate lang gerechnet haben.

9.808.358 Stellen hat die neue grösste bekannte Primzahl. Damit ist sie zwar rund 650.000 Ziffern länger als die vorherige Rekordprimzahl - aber noch nicht lang genug, die erste Primzahl mit mehr als zehn Millionen Stellen sein. Für diesen Zahlenwurm hat die Electronic Frontier Foundation nämlich ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar (79.266 Euro) ausgelobt.

Mengen-Lehre: Rund 2500 eng bedruckte DIN-A4-Seiten würde die neu entdeckte 44. Mersenne-Primzahl umfassen

Mengen-Lehre: Rund 2500 eng bedruckte DIN-A4-Seiten würde die neu entdeckte 44. Mersenne-Primzahl umfassen Neun Monate lang rechneten 700 Computer - dann spuckten die Rechner die neue Rekordprimzahl aus. Damit brachen die federführenden US-Mathematiker Curtis Cooper und Steven Boone von der Central Missouri State University ihren eigenen Weltrekord: Im Dezember 2005 hatten sie eine Primzahl mit 9.152.052 Ziffern entdeckt. Dass die kürzlich gefundene Zahl wirklich neuer Rekord ist, hätten Kollegen schon bestätigt, berichtet das Internet- Primzahlenprojekt Gimps (Great Internet Mersenne Prime Search).

Bei dem Rekord handelt es sich um die 44. bekannte sogenannte Mersenne-Primzahl. Solche - nach dem französischen Mönch Marin Mersenne - benannte Zahlen berechnen sich nach der Formel $2^n - 1$.

Die neue Rekordzahl ergibt sich aus $2^{32.582.657} - 1$ und wird deswegen „M32582657“ genannt. Wie es aussieht, wenn sich fast zehn Millionen Ziffern ohne Punkt und Komma aneinanderreihen, sehen Sie hier: Das erste Zehntausendstel - die 44. bekannte Mersenne-Primzahl. Diese Zahl von einem einzigen Computer berechnen zu lassen, hätte laut Gimps mehr als 4000 Jahre gedauert.

Primzahlen, also natürliche Zahlen, die sich nur durch 1 und sich selbst ohne Rest teilen lassen, sind von wissenschaftlichem Interesse, aber auch für die Signalübertragungstechnik und für Verschlüsselungsmethoden von Bedeutung. „Zudem fördert das Primzahlenprojekt das Interesse an der Mathematik, indem es die Fantasie der der jungen Teilnehmer anspricht“, sagte George Woltman, der Gimps 1996 gegründet hat.