

Repetition Logarithmen

- Ich kann den Ausdruck $\log_2 8$ berechnen.
→ $\log_2 8 = 3$, weil $2^3 = 8$.
- Ich weiss, von welchen Zahlen ich den Logarithmus bestimmen kann.
→ von rationalen Zahlen grösser 0. Der Logarithmus kann für Zahlen ≤ 0 nicht berechnet werden.
- Ich weiss, was mit der Abkürzung lg gemeint ist.
→ lg ist die Abkürzung für den Logarithmus mit Basis 10 (\log_{10}).
- Ich kann z.B. $\log_{10} 5$ direkt mit dem TR berechnen.
→ Die Taste für den Zehnerlogarithmus ist nicht mit lg angeschrieben, sondern einfach mit log. Es wird also log und dann 5 getippt (oder umgekehrt, je nach Modell). Das Ergebnis zur Kontrolle: $\log_{10} 5 \approx 0.699$
- Ich weiss, was mit der Abkürzung ln gemeint ist.
→ ln ist die Abkürzung für den Logarithmus mit Basis e (natürlicher Logarithmus, $e \approx 2.72$). Der natürliche Logarithmus ist auf dem TR zu finden unter der Abkürzung ln. Ein Beispiel $\ln(5) \approx 1.609$
- Ich kenne die Logarithmenregeln, d.h. ($x, y > 0, a \in \mathbf{Q}^+ \setminus \{0\}, q \in \mathbf{Q}$):
 - $\log_a(x \cdot y) = \dots$
 - $\log_a(x : y) = \dots$
 - $\log_a x^q = \dots$→
 - $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$
 - $\log_a(x/y) = \log_a x - \log_a y$
 - $\log_a x^q = q \cdot \log_a x$
- Ich kann z.B. den Ausdruck $\log_2 9$ mit dem TR berechnen, obwohl die Basis 2 nicht getippt werden kann.
→ Dies geschieht mit Hilfe des Basiswechsels, es gilt:

$$\log_2 9 = \frac{\log_{10} 9}{\log_{10} 2} \approx 3.17$$

Erstaunlicherweise funktioniert dieser Basiswechsel nicht nur für die Basis 10, sondern für jede beliebige Basis, also:

$$\log_2 9 = \frac{\ln 9}{\ln 2} = \frac{\log_a 9}{\log_a 2}$$

- Ich kenne den Zusammenhang zwischen dem Logarithmus und der dazugehörigen Exponentialgleichung, ich kann z.B. die Gleichung $3^x = 4$ lösen.
Es gilt: → $\log_a b = x \Leftrightarrow a^x = b$. Übertragen auf unser Beispiel:

$$3^x = 4 \Rightarrow x = \log_3 4 = \frac{\log_{10} 4}{\log_{10} 3} \approx 1.26$$

Übungen

1. Berechne die Werte der folgenden Logarithmen.

a) $\log_3 81 =$	b) $\log_5 25 =$	c) $\log_2 16 =$
d) $\log_{12} 144 =$	e) $\log_5 1 =$	f) $\log_{10} \frac{1}{10} =$
g) $\log_{0,5} 8 =$	h) $\log_{10} 0.01 =$	i) $\log_2 8^{12} =$

[4, 2, 4, 2, 0, -1, -3, -2, 36]

2. Berechne die Werte der folgenden Logarithmen.

a) $\lg 10^7 =$	b) $\lg 10000 =$	c) $\lg 0.0001 =$
-----------------	------------------	-------------------

[7, 4, -4]

3. Berechne die Werte der folgenden Logarithmen ($a \in \mathbf{R}^+, n \in \mathbf{N}$).

a) $\log_a 1 =$	b) $\log_a a =$	c) $\log_a a^2 =$
d) $\log_a a^n =$	e) $\log_a \frac{1}{a} =$	f) $\log_a \frac{1}{a^2} =$
g) $\log_a \frac{1}{a^n} =$	h) $\log_a \sqrt{a} =$	i) $\log_a \sqrt[3]{a} =$

[0, 1, 2, n, -1, -2, -n, 1/2, 1/3]

4. Berechne die folgenden natürlichen Logarithmen !

a) $\ln e^2 =$	b) $\ln \frac{1}{e} =$	c) $\ln \sqrt{e} =$
d) $\ln e =$	e) $\ln(\ln(e)) =$	f) $e^{2\ln(e)} =$
g) $\ln 0 =$	h) $\ln e^{10} =$	

[2, -1, 1/2, 1, 0, e^2 , k.W., 10]

5. Zerlege die Logarithmen mit Hilfe der Logarithmengesetze !

a) $\log_3 (27 \cdot 9) =$	b) $\log_2 (8 \cdot 16) =$	c) $\log_2 (16^5) =$
d) $\log_4 (2) + \log_4 (8) =$	e) $\log_3 (54) - \log_3 (2) =$	f) $\log_2 (48) - \log_2 (3) =$

[5, 7, 20, 2, 3, 4]

6. Skizziere die Graphen der Funktionen f mit den folgenden Vorschriften:

a) $f(x) = \log_3 x$	b) $f(x) = \log_{0,5} x$
----------------------	--------------------------

7. Stelle rechnerisch fest, ob der angegebene Punkt oberhalb, unterhalb oder auf dem Graphen mit der Vorschrift $f(x) = \log_2 x$ liegt.

a) $P_1 = (7 3)$	[oberhalb]	b) $P_2 = (32 5)$	[auf]
--------------------	------------	---------------------	-------

8. Gib x als Dezimalzahl an. Runde Dein Ergebnis auf zwei Stellen nach dem Komma.

a) $x = \lg (2.46 \cdot 10^{7890})$	[7890.39]	b) $x = \log_2 (2.84 \cdot 10^{-4657})$	[-15468.71]
-------------------------------------	-----------	---	-------------

9. Löse die folgenden Exponentialgleichungen. Runde Dein Ergebnis auf zwei Kommastellen. Kontrolliere Dein Ergebnis durch Einsetzen.

a) $2^{4x} + 2^{4x+5} = 99$	b) $5^{3x+1} - 5^{3x-1} = 48$
-----------------------------	-------------------------------

[0.40; 0.48]

10. Löse die folgenden Exponentialgleichungen. Runde Dein Ergebnis auf zwei Kommastellen. Kontrolliere Dein Ergebnis durch Einsetzen.

a) $10^x + 10^{2x} = 600$

b) $2^x + 3 = 4^x$

[1.38;1.20]

11. Löse die folgenden Gleichungen ($a \in \mathbf{R}^+$). Gib Dein Ergebnis in der Form $\mathbf{L} = \{\dots\}$ an.

a) $3 \log_5 x = 2 \log_5 8$

b) $\log_3(x+4) + \log_3(x) = \log_3(x+1)$

c) $\log_4 x^2 - \log_4 8 = \log_4 8 - \log_4 27$

d) $\frac{1}{2} \log_6(x+1) = \log_6 10 - \log_6 2$

[4;0.30;±1.54;24]